

Casus ALHYDRAN:

Brandwond door vlam (onder)been

1. Beschrijving casus

leeftijd patiënt	15 jaar
geslacht	vrouw
oorzaak	brandwond door vlam
behandeling voor wondsluiting	1 week Flammazine, daarna hydrocolloïd gel + Jelonet als wondverband en lichttherapie ter bevordering van de wondgenezing
therapie nazorg	onmiddellijk na wondsluiting drukverbanden, siliconenverbanden en hydratatie met ALHYDRAN (2 tot 3 maal per dag) Na 1 jaar druktherapie i.c.m. ALHYDRAN verder met ALHYDRAN als monotherapie

2. Ontwikkeling van de brandwond



3. Conclusies medisch team

- Wondgenezing na 19 dagen
- Volledig gematureerd binnen 1 jaar, met uitstekende resultaten wat betreft kleur (licht hypopigmentatie) en elasticiteit van het litteken
- Absoluut geen hypertrofische littekenvorming en beperking van mobiliteit

4. Ervaring door patiënt (en ouders)

- In eerste instantie niet erg enthousiast over de typische Aloë Vera-geur van ALHYDRAN
- De patiënt was echter zeer tevreden over de andere eigenschappen van de crème zoals gemak van aanbrengen en de hydratatie waardoor de huid veel soepeler werd
- Praktisch geen last van jeuk

Casus: Prof. dr. S. Monstrey en H. Hoeksema. Universiteitsziekenhuis Gent - afdeling Plastische en reconstructieve chirurgie en brandwondencentrum, België